ぶどう膜原発悪性黒色腫の腫瘍マーカーとしての 5-S-cysteinyl dopa

後藤 浩¹⁾, 手納 朋子¹⁾, 工藤 仁¹⁾, 岩崎 琢也¹⁾
村松 隆次¹⁾, 臼井 正彦¹⁾, 若松 一雅²⁾, 伊藤 祥輔²⁾

¹⁾東京医科大学眼科学教室, ²⁾藤田保健衛生大学衛生学部化学教室

要 約

メラニン合成過程における主要中間代謝産物の一つである 5-S-cysteinyl dopa (5-S-CD) が、ぶどう膜悪性黒色腫の腫瘍マーカーとして臨床的に応用が可能であるかを検討した。その結果、10 例のぶどう膜悪性黒色腫患者のうち、腫瘍が眼内に限局していた 7 例中 6 例では血清 5-S-CD 値は正常範囲内であったが、眼外へ転移を生じた後の 3 例では値が上昇していた。また、血清中の 5-S-CD 値が正常範囲内にある症例

でも、前房水や硝子体中の 5-S-CD は高値となることがあり、眼内液中 5-S-CD の測定がぶどう膜悪性黒色腫の診断マーカーとして臨床的に応用可能であることが示唆された。(日眼会誌 102: 319—326, 1998)

キーワード: ぶどう膜悪性黒色腫, 腫瘍マーカー, 5-S-CD

5-S-cysteinyl dopa as a Tumor Marker for Primary Uveal Malignant Melanoma

Hiroshi Goto¹⁾, Tomoko Tenou¹⁾, Hitoshi Kudo¹⁾, Takuya Iwasaki¹⁾, Ryuji Muramatsu¹⁾
Masahiko Usui¹⁾, Kazumasa Wakamatsu²⁾ and Shosuke Ito²⁾

¹⁾Department of Ophthalmology, Tokyo Medical College

²⁾Fujita Health University School of Health Sciences

Abstract

The clinical significance of 5-S-cysteinyl dopa (5-S-CD), a major intermediate in melanin synthesis, was evaluated as a potential diagnostic tumor marker for uveal melanoma. Serum concentrations of 5-S-CD in 6 out of 7 patients with uveal melanoma in the absence of extraocular metastases were close to those of controls. In contrast, serum concentrations of 5-S-CD were found to be elevated in 3 patients with systemic metastases of melanoma. In addition, 5-S-CD in intraocular fluids, including

both aqueous and vitreous humor, was elevated in patients with uveal melanoma regardless of the presence or absence of systemic metastases. These results suggest that 5-S-CD in the intraocular fluid may serve as a useful biochemical marker for the diagnosis of uveal melanoma. (J Jpn Ophthalmol Soc 102: 319—326, 1998)

Key words: Uveal melanoma, Tumor marker, 5-S-CD

I 緒 言

ぶどう膜悪性黒色腫は、網膜芽細胞腫と並ぶ代表的な眼内悪性腫瘍の一つである。その診断は検眼鏡的所見に加え、超音波断層検査や磁気共鳴画像 (magnetic resonance imaging, MRI) などの画像診断検査、ガリウムシンチグラフィや N-isopropyl-p [¹²³I] -iodoamphetamine (¹²³I-IMP) シンチグラフィ¹⁾²⁾などの核医学検査の組み合わせにより行われるが、確定診断は他の悪性腫瘍の場合と同様、病理組織診断に委ねられている。しかしながら、

ぶどう膜に原発した悪性黒色腫の組織診断については、その評価に少なからず問題のある針生検 (fine-needle aspiration biopsy, FNAB)³⁾や、適応症例に限りのある腫瘍の局所切除術⁴⁾⁵⁾でも行われないう限り、通常は視機能の喪失を意味する眼球摘出術によってはじめて可能となるというジレンマがある。したがって、本症の臨床診断に際しては、より多くの情報をできるだけ侵襲の少ない方法で収集することが望まれる。

悪性腫瘍の補助診断法としては、1848 年のベンス・ジョーンズ蛋白の発見以来、ヒト絨毛性ゴナドトロピン

別刷請求先: 160-0023 東京都新宿区西新宿 6-7-1 東京医科大学眼科学教室 後藤 浩
(平成 9 年 9 月 4 日受付, 平成 9 年 12 月 5 日改訂受理)

Reprint requests to: Hiroshi Goto, M.D. Department of Ophthalmology, Tokyo Medical College, 6-7-1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan

(Received September 4, 1997 and accepted in revised form December 5, 1997)

(human chorionic gonadotropin, HCG), 癌胎児性抗原 (carcinoembryonic antigen, CEA), CA 19-9 など数多くの血清, 尿中腫瘍マーカーの測定が臨床的に行われているが⁷⁾, このような腫瘍マーカーがぶどう膜悪性黒色腫の診断にも応用可能となれば, その精度の向上のみならず, 病変の進展度の評価や治療方針決定の上でも大いに参考となるはずである。

そこで今回, 主に皮膚科領域における悪性黒色腫, 中でも転移病巣の早期発見や予後の推察などに利用されている生化学マーカー, 5-S-cysteinyl-dopa (5-S-CD) の測定⁸⁾⁻¹⁰⁾が, ぶどう膜悪性黒色腫の診断においても臨床的に応用可能か否か, 自験例を対象に検討を行ったので報告する。

II 対象と方法

1. ぶどう膜悪性黒色腫患者の血清 5-S-CD の測定

対象は平成2年から平成8年の間に, 東京医大病院眼科で臨床的もしくは組織学的にぶどう膜原発の悪性黒色腫と診断された10例である(表1)。このうち, 症例1および2の虹彩(毛様体)悪性黒色腫については組織学的診断は得られていないが, 細隙灯顕微鏡所見と典型的なMRI所見, さらに¹²⁵I-IMP シンチグラフィなどの検査結果から臨床的に悪性黒色腫と診断した。これら10例の患者から真空採血管を用いてヘパリン無添加で採血し, 遠心分離によって得た血清中の5-S-CDを測定した。

なお, 10例中4例(症例3, 4, 5および6)については, 5-S-CD測定時に既に患眼の眼球摘出術が行われており, 無眼球の状態であった。他の6例(症例1, 2, 7, 8, 9および10)は, 諸検査の結果から臨床的にぶどう膜悪性黒色腫と診断され, 眼球摘出術などの治療が行われる前に血清5-S-CDが測定された。

2. ぶどう膜悪性黒色腫患者の眼内液中 5-S-CD の測定

3例のぶどう膜悪性黒色腫患者から前房水および硝子

体液を採取して, それぞれ5-S-CDの測定を行った。前房水についてはいずれも治療目的に行った眼球摘出術施行直後に, 27G針を接続したシリンジを用いて輪部から採取した。硝子体液は同じく眼球摘出直後に眼球をカミソリ刃で半割し, ピペットを用いて採取した。

眼内液中の5-S-CDを測定した各症例の臨床像は, 以下の通りである。

症例8: 62歳, 男性。初診時から左眼眼底後極部に滲出性網膜剥離を伴った黄褐色のドーム状隆起性病変がみられ, 徐々に増大していった(図1)。MRIでは網膜剥離を示す所見とともに, T1強調画像で脳実質と比較して高信号な腫瘍の中に一部低信号を示す部分が, T2では全体に低信号を示す腫瘍が描出された(図2)。¹²⁵I-IMP single photone emission computed tomography (SPECT)では病巣に一致して陽性所見が得られた。眼球摘出後の組織学的検索により, Callender分類の混合型悪性黒色腫と診断された(図3)。腫瘍の内部は, メラニン色素の密な部分と比較的疎な部分が混在していた。

症例9: 63歳, 男性。左眼眼底赤道部の比較的扁平な悪性黒色腫に対し, 色素レーザー光凝固および冷凍凝固による保存療法の治療歴があった。その後, 硝子体出血に対して硝子体手術を施行したが出血を繰り返し, 止むを得ず眼球を摘出, その際に採取した眼内液を試料として測定に用いた。組織学的には腫瘍組織はほぼ癒着化しており, メラニン色素を含んだマクロファージが散在性に認められた。

症例10: 67歳, 女性。3~4か月の間に急激に増大していった右眼の脈絡膜腫瘍(図4)で, MRI(図5), ¹²⁵I-IMP, SPECTのいずれの検査所見も悪性黒色腫に矛盾のない結果であった。眼球摘出術を行い, 組織学的にメラニン色素に非常に富んだ混合型悪性黒色腫と診断された(図6)。

3. ぶどう膜悪性黒色腫患者以外の血清 5-S-CD の測定

表1 5-S-cysteinyl-dopa (5-S-CD)の測定を行ったぶどう膜悪性黒色腫症例

症例	年齢 (歳)	性別	腫瘍の局在	腫瘍の大きさ (長径×高さ mm)	組織型	治療法	転帰
1	72	女	虹彩	2×2	不明	経過観察のみ	死亡(転移については不明)
2	75	男	虹彩・毛様体	4×3	不明	経過観察のみ	
3	69	女	脈絡膜	14×8	紡錘B型	眼球摘出術	
4	76	男	脈絡膜	13×9	混合型	眼球摘出術	肝転移
5	46	男	脈絡膜	7×4	混合型	眼球摘出術	肝転移, 死亡
6	50	女	脈絡膜・毛様体	15×8	類上皮型	局所切除術, 眼球摘出術	肺・脳・骨盤転移, 死亡
7	74	女	脈絡膜	6×6	混合型	眼球摘出術	
8	62	男	脈絡膜	12×6	混合型	眼球摘出術	
9	63	男	脈絡膜	7×3	混合型	冷凍・光凝固, 眼球摘出術	
10	67	女	脈絡膜	16×12	混合型	眼球摘出術

図 1 症例 8 の眼底写真.

眼底後極部に黄褐色のドーム状隆起性病変がみられる。周囲には滲出性網膜剥離を生じている。

図 2 症例 8 の磁気共鳴画像 (MRI).

T1 強調画像で、脳実質と比較して高信号を示す腫瘍の中に一部低信号の部分が混在している (A)。T2 強調画像では全体が低信号に描出されている (B)。腫瘍の鼻側には滲出性網膜剥離が認められる。

対照としての悪性黒色腫患者以外の血清 5-S-CD 値については、今回と同様の方法ならびに同一施設で測定された結果を参考とした¹¹⁾。その内訳は、健常成人血清 23 例 (年齢 18~44 歳) および悪性黒色腫患者以外の皮膚疾患を有する患者 10 例 (53~84 歳) の合計 33 例で、男性 20 例、女性 13 例、平均年齢は 39.0 歳であった。

図 3 症例 8 の組織学的所見.

紡錘 B 型細胞と類上皮型細胞から成る混合型悪性黒色腫。ヘマトキシリン・エオジン染色、バーは 20 μ m

図 4 症例 10 の眼底写真.

硝子体中に突出した大きな隆起性病変が右眼の耳側に観察される。

4. ぶどう膜悪性黒色腫患者以外の眼内液中 5-S-CD の測定

ぶどう膜悪性黒色腫以外の眼疾患の手術の際に、眼内液を採取して 5-S-CD 値を測定し、対照として用いた。

眼内液のうち、前房水については白内障手術の際に得られた 24 検体 (男性 9 例、女性 15 例、年齢 37~89 歳、平均 73.4 歳) と、網膜剥離症例に pneumatic retinopexy¹²⁾ を施行、その際に眼圧の下降目的で前房穿刺を行った 4 例 (男性 3 例、女性 1 例、年齢 42~59 歳、平均 52.0 歳) の計 28 検体について測定した。

硝子体については、硝子体手術の際に眼内に灌流液を流入させる前に硝子体カッターで切除吸引したものを試料として用いた。対照とした疾患は、黄斑円孔、網膜前膜症、増殖糖尿病網膜症、ぶどう膜炎、悪性黒色腫以外の眼内悪性腫瘍などを含む 23 例 (男性 13 例、女性 10 例、年齢 13~73 歳、平均 51.7 歳) であった。

5. 5-S-CD の測定方法

試料として用いた血清および眼内液は、いずれも採取

図5 症例10のMRI.

T1強調画像で高信号,T2強調画像で低信号を示す腫瘍が描出されている。眼底後極部には網膜剥離も認められる。

図6 症例10の組織学的所見.

主に紡錘B型細胞と、一部に類上皮型細胞を交えた混合型悪性黒色腫。ヘマトキシリン・エオジン染色,バーは20μm

後直ちに -70°C に保存し,既報¹³⁾に従って1か月以内に5-S-CDの測定を行った。まず,前処理として試料をアルミナ吸着させ,リン酸緩衝液(pH 4.0)でアルミナを洗浄することによって夾雑物質を取り除いた。その後,5-S-CDなどのカテコール類を0.4 M 過塩素酸で溶離し,電気化学検出器付きの高速液体クロマトグラフィーを用いて定量した。内部標準物質としては5-S-cysteinyl- α -

methyl-dopaを使用した。

III 結 果

1. ぶどう膜悪性黒色腫患者の血清5-S-CD測定値

各ぶどう膜悪性黒色腫患者の血清5-S-CDの測定結果を表2に示した。この中で,後述する対照群の測定値と比較して異常高値を示したのは,症例1,4,5および6の4例で,症例5は肝臓へ,症例6は肺および頭蓋内への転移が既に明らかとなっていた。症例4については,血清5-S-CDが高値であることが判明した後に改めて施行した全身検査によって,初めて肝臓への転移が明らかとなった。症例1の虹彩悪性黒色腫が疑われた症例については,当科で血清5-S-CDの上昇が確認されて間もなく,慢性関節リウマチのために他院に入院となり,その後,肝機能および腎機能障害が徐々に進行し,腎不全により死亡した。生存中,少なくとも画像診断上は転移を疑わせる所見は得られなかった。

2. ぶどう膜悪性黒色腫患者の眼内液中5-S-CD測定値

ぶどう膜悪性黒色腫患者の眼内液中5-S-CD値の測定結果は表2のごとくであった。前房水,硝子体ともに症例8と症例10では高値を示し,特に症例10では著しく高い値となった。一方,光凝固や冷凍凝固療法などの保存療法の既往のある症例9では,後述する白内障や網膜剥離患者の眼内液中5-S-CDと比較して,特に高い値とはならなかった。

3. ぶどう膜悪性黒色腫患者以外の血清5-S-CD測定値

健常成人および悪性黒色腫以外の皮膚疾患における血清5-S-CDの平均値±標準偏差は, 4.3 ± 1.8 nmol/Lであった¹¹⁾。

4. ぶどう膜悪性黒色腫患者以外の眼内液中5-S-CD測定値

ぶどう膜悪性黒色腫以外の前房水中5-S-CDの測定値は,白内障では平均 8.7 ± 2.6 nmol/L(表3),網膜剥離では 7.6 ± 3.7 nmol/L(表4)という結果となり,全体では平均 8.6 ± 2.7 nmol/Lという測定値となった。

同様に,網膜硝子体疾患その他における硝子体中の5-S-CD値は,平均 4.7 ± 2.1 nmol/Lであった(表5)。

IV 考 按

悪性腫瘍に対して病理組織学的検索を目的として行う生検術には慎重を要し,皮膚悪性黒色腫においても病巣全体を切除する excisional biopsy はともかく,病変の一部の採取にとどまる incisional biopsy については一般に禁忌とされ¹⁴⁾,この原則はぶどう膜悪性黒色腫についても当てはまるものと考えられる。ぶどう膜悪性黒色腫における excisional biopsy とは,十分な safety margin を確保した上で行う局所切除術¹⁵⁾に他ならないが,現実

表 2 ぶどう膜悪性黒色腫の血清および眼内液中 5-S-CD 値

症例	腫瘍の局在	5-S-CD(nmol/L)		
		血清	前房水	硝子体
1	虹彩	21.3	ND	ND
2	虹彩・毛様体	2.7	ND	ND
3	脈絡膜	4.5	ND	ND
4	脈絡膜	11.7	ND	ND
5	脈絡膜	81.6	ND	ND
6	脈絡膜・毛様体	13.0	ND	ND
7	脈絡膜	2.8	ND	ND
8	脈絡膜	3.7	13.1	55.8
9	脈絡膜	4.5	7.9	8.2
10	脈絡膜	3.6	1,221	1,840

ND : not determined

表 3 白内障の前房水中 5-S-CD 値

症例	年齢(歳)	性別	疾患名	前房水中 5-S-CD (nmol/L)
1	86	女	白内障	7.5
2	49	男	〃	13.4
3	73	男	〃	10.5
4	73	男	〃	6.8
5	82	男	〃	7.5
6	82	男	〃	8.2
7	64	女	〃	8.3
8	62	女	〃	6.9
9	62	女	〃	7.3
10	66	女	〃	9.7
11	86	女	〃	7.3
12	82	男	〃	5.0
13	82	女	〃	4.9
14	60	女	〃	10.4
15	88	女	〃	9.6
16	88	女	〃	6.2
17	89	男	〃	6.4
18	97	女	〃	8.3
19	85	女	〃	11.2
20	57	男	〃	10.0
21	57	男	〃	7.7
22	75	女	〃	12.4
23	79	女	〃	8.1
24	37	女	〃	15.5
平均	73.4 ± 14.8			8.7 ± 2.6

平均値 ± 標準偏差

表 4 網膜剝離の前房水中 5-S-CD 値

症例	年齢(歳)	性別	疾患名	前房水中 5-S-CD (nmol/L)
1	59	女	網膜剝離	12.7
2	59	男	〃	5.8
3	42	男	〃	7.7
4	48	男	〃	4.1
平均	52.0 ± 8.4			7.6 ± 3.7

はこの術式,治療方法が適応となる症例は多くはない。したがって,ぶどう膜悪性黒色腫の場合,視力の喪失に直結し,なおかつ精神的な苦痛も甚だしい眼球摘出術を行うことによって,はじめて組織学的な裏付けに基づいた確定診断が得られるという問題がある。

悪性黒色腫に対する眼球摘出術の是非については, Zimmerman ら¹⁵⁾の警鐘以来,議論の分かれるところであるが,欧米諸国ほど放射線療法が普及していない我が国においては,現在でも本術式が治療の第一選択肢とならざるを得ないことが多いと思われる。また,組織学的検索によって悪性黒色腫との確定診断が得られた後も,再発や転移の有無の検索方法については一定の基準はなく,転移を発見した後も有効な化学療法が確立していないこともあって,その対応には苦慮することが少なくない。

以上のような背景から,ぶどう膜悪性黒色腫の診断,特に術前臨床診断をより確実なものとし,術後も全身転移の有無を含めた病変の進展度を知る上で,本疾患に特異的な腫瘍マーカーの臨床応用が期待される。

今回,ぶどう膜悪性黒色腫の生化学マーカーとして血清および眼内液における定量を行った 5-S-CD は,黒色腫がメラニン,特にフェオメラニンを合成していく過程で生じる中間代謝産物の一つである¹⁶⁾¹⁷⁾。この 5-S-CD の一部は血中へと漏出し,黒色腫組織内や肝での代謝を受けた後に尿中へと排出される¹⁸⁾。

皮膚悪性黒色腫においては,この 5-S-CD が摘出腫瘍組織のスタンプ標本中に発現されることが知られており,さらに尿中,血清レベルでの測定が全身転移の早期発見や進展度の把握,さらには治療効果判定にも有用であることが報告^{8)9)17)~21)}されている。また,尿中に排出される 5-S-CD よりも血清中の 5-S-CD の測定の方が,再発転移時にはより早期に,かつ有意に高値を示すことが指摘されている²⁰⁾²¹⁾。ただし,皮膚原発の悪性黒色腫の場合,他の多くの腫瘍マーカーと同様⁷⁾,転移を生じる前の段階では血清レベルで異常値が反映されることはほとんどないようである^{8)9)17)~21)}。

これに対してぶどう膜組織では,その豊富な脈管系の存在と血流故に,例え腫瘍が眼内に限局していても,血清レベルで早期に 5-S-CD が上昇してくるのではないかと考えた。しかしながら,今回測定を行った症例に関する限り,ぶどう膜悪性黒色腫においても皮膚悪性黒色腫の場

表 5 網膜硝子体疾患の硝子体中 5-S-CD 値

症例	年齢(歳)	性別	疾患名	硝子体中 5-S-CD (nmol/L)
1	70	女	黄斑円孔	9.5
2	73	女	黄斑円孔	5.4
3	70	女	黄斑前膜	8.9
4	63	女	黄斑前膜	30
5	35	男	糖尿病網膜症	3.7
6	70	女	糖尿病網膜症	7.9
7	39	男	糖尿病網膜症	5.1
8	58	女	糖尿病網膜症	5.9
9	55	男	糖尿病網膜症	3.2
10	54	女	糖尿病網膜症	2.5
11	58	男	糖尿病網膜症	3.2
12	70	女	糖尿病網膜症	7.9
13	39	男	糖尿病網膜症	5.1
14	61	男	糖尿病網膜症	1.5
15	58	男	糖尿病網膜症	8.3
16	62	男	網膜静脈閉塞症	8.7
17	59	女	裂孔原性網膜剥離	7.7
18	46	男	裂孔原性網膜剥離	6.1
19	43	女	トキソカラ症	1.9
20	29	男	サルコイドーシス	1.3
21	55	男	原因不明ぶどう膜炎	5.4
22	13	男	網膜芽細胞腫	1.6
23	67	男	眼内悪性リンパ腫	3.3
平均	51.7 ± 14.8			4.7 ± 2.1

合と同様、眼外に転移を生じる前の段階では血清 5-S-CD 値は正常範囲内から逸脱することはなく、原発巣の早期発見に有効な血清マーカーとはなり難いことが伺えた。その一方で、眼外へ転移を来したぶどう膜悪性黒色腫では、皮膚その他の悪性黒色腫と同様、血清中の 5-S-CD は高値を示し、その値は転移病巣の病勢を反映しているようであった。実際、症例 6 では全身の多臓器に転移巣が拡大していくに従って血清 5-S-CD 値も上昇していった(未発表データ)。また、症例 4 のように、画像診断検査上で異常所見がとらえられる前に血清 5-S-CD の上昇が確認されるようなケースもあり、この生化学マーカーの測定を行うことによってぶどう膜悪性黒色腫の転移の有無が早期に発見される可能性が示された。もともと悪性度の低いとされる虹彩悪性黒色腫が疑われた症例 1 において、血清 5-S-CD が高値となった理由については不明である。この症例については、画像診断上、眼外への明らかな転移巣は発見されないまま他院で死亡したため、血清腫瘍マーカーとしての 5-S-CD の評価はできなかった。

血清以外の試料、特に体液中の 5-S-CD を測定し、腫瘍マーカーとして疾患の診断に応用する試みについては、

これまでに胸腹水¹⁹⁾や脳脊髄液²⁰⁾を用いた報告がある。頭蓋内原発悪性黒色腫では髄液中の 5-S-CD が高値となるが、軟脳膜メラノーシスを合併することの多い巨大色素性母斑患者の髄液中 5-S-CD は検出限界値以下であったという²⁰⁾。眼科領域、すなわち、ぶどう膜悪性黒色腫患者の 5-S-CD については、血清レベルでの測定はごく限られた症例に対して行われているが⁷⁾²⁰⁾、眼内液を試料とした報告はこれまでにない。

今回の検索で、症例 8 と症例 10 のように血清レベルでは正常範囲内にあったにも拘らず、前房水や硝子体中では 5-S-CD が非常に高い値を示したということは、これらの眼内液中の 5-S-CD がぶどう膜悪性黒色腫の局所における腫瘍マーカーとして応用可能であり、術前診断精度の向上に寄与する可能性を示している。特に疑診例や、併発する網膜剥離や硝子体出血などのために検眼鏡的にも眼内の観察が困難なケースでは、有力な補助診断法と成り得るかも知れない。今回の 2 例では硝子体中の 5-S-CD 値が前房水中のそれと比較してより高い結果となったが、これには腫瘍の局在部位の影響も関与しているものと推察される。また、症例 10 の前房水と硝子体中で 5-

S-CD が著しく高い値を示した理由については不明であるが、この症例は比較的短期間のうちに腫瘍が急速に拡大していった経緯があり、メラニン合成がその間に眼内で活発に行われ、眼内液採取時には中間代謝産物である 5-S-CD 量が極めて増加した状態にあったことが推察される。

一方、症例 9 の眼内液中の 5-S-CD 値については、対照として測定した白内障例などとの差がみられなかった。この症例では過去に光凝固や冷凍凝固などの保存療法が繰り返し施行され、硝子体出血に対して硝子体手術が行われた後の眼内液を試料として用いており、しかも最終的に摘出された眼球の病理組織標本をみる限り、腫瘍は線維性組織に置き換わり、瘢痕化していた。したがって、この症例の眼内液中の 5-S-CD 値が高値を示さなかった結果については、むしろ理に叶っていると考えられた。

なお、眼内 5-S-CD の基準値の設定のために、対照として測定したぶどう膜悪性黒色腫を除く眼疾患の眼内液中 5-S-CD では、前房水中の値が硝子体中のその 2 倍近い値となったが、その理由の一つとしては前房水がメラニン色素の豊富な虹彩に直接接触、循環していることなどが考えられる。

前房水、硝子体ともに今回は眼球摘出後に採取したものを試料として測定に供したが、臨床的にはこれらの眼内液を術前に採取して、補助診断の一環として応用していく方法が考えられる。特に腫瘍サイズが小さく、画像検査などでも診断が得にくい時、随伴する網膜剥離や硝子体出血などにより検眼鏡的に腫瘍を直接観察することが不可能な時、さらには他の眼内隆起性病変との鑑別が困難な場合などでは、眼内液中の 5-S-CD を測定することの臨床的意義が高くなるものと思われる。

今後、実際に眼内液中の 5-S-CD を腫瘍マーカーとして利用していく際の問題点としては、まずはその特異性の問題が挙げられよう。特に、眼内に発生する他のメラノサイト由来の腫瘍性病変、すなわち、虹彩や脈絡膜にみられる母斑、視神経乳頭に好発する黒色細胞腫、さらに、網膜色素上皮肥大などにおける眼内液中の 5-S-CD がどのような値を示すのかは現在のところ不明であり、今後問題となろう。さらに、腫瘍組織中のメラニン色素の多寡が 5-S-CD 測定値に及ぼす影響についても今後の検討課題であろう。実際に術前診断法として眼内液を採取するとなれば、前房穿刺や硝子体切除といった操作に伴う眼合併症の発生に対しても十分な注意を払う必要があることはいうまでもない。

いずれにしても、今後さらに症例数を増やして検討を重ねることにより、腫瘍の大きさ、局在部位、組織学的特徴などと、眼内液中の 5-S-CD 測定値の相関についても明らかとなっていくものと考えられる。

文 献

- 1) Wada M, Ichiya Y, Katsuragi M, Kuwabara Y, Ayabe Z, Matsuura K, et al : Scintigraphic visualization of human malignant melanoma with N-isopropyl-p-[¹²⁵I]-iodoamphetamine. Clin Nucl Med 10: 415—417, 1985.
- 2) 川村俊彦, 安田冬子, 大谷悦子, 原 二郎, 北谷孝嗣, 井上美佐: 脈絡膜悪性黒色腫の診断に¹²⁵I シンチグラフィが有用であった 1 症例. 眼紀 44: 1311—1315, 1993.
- 3) Folberg R, Augsburger JJ, Gamel JW, Shields JA, Lang WR: Fine-needle aspirates of uveal melanomas and prognosis. Am J Ophthalmol 100: 654—657, 1985.
- 4) Peyman GA, Apple DJ: Local excision of choroidal malignant melanoma. Full-thickness eye wall resection. Arch Ophthalmol 92: 216—218, 1974.
- 5) 箕田健生: 眼内腫瘍の手術的治療. 眼臨 85: 2063—2080, 1991.
- 6) 後藤 浩: 悪性黒色腫に対する部分切除. 眼科 36: 1325—1333, 1994.
- 7) 大倉久直: 腫瘍マーカー. 診断の現状. 医学のあゆみ 149: 453—456, 1989.
- 8) 堀越貴志, 若松一雅, 伊藤祥輔: 悪性腫瘍の生化学的マーカー. 日皮会誌 104: 1621—1624, 1994.
- 9) Horikoshi T, Ito S, Wakamatsu K, Onodera H, Eguchi H: Evaluation of melanin-related metabolites as markers of melanoma progression. Cancer 73: 629—636, 1994.
- 10) Ye Zushou, Kageshita T, Ishihara T, Ito S, Ono S: A case of malignant melanoma: Disease progression correlated with serum levels of 5-S-cysteinyldopa (5-S-CD) and intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1). J Dermatol 22: 370—375, 1995.
- 11) Wakamatsu K, Ito S, Horikoshi T: Normal values of urinary excretion and serum concentration of 5-S-cysteinyldopa and 6-hydroxy-5-methoxy-indole-2-carboxylic acid, biochemical markers of melanoma progression. Melanoma Res 1: 141—147, 1991.
- 12) Hilton GF, Gizzard WS: Pneumatic retinopexy. A two-step outpatient operation without conjunctival incision. Ophthalmology 93: 626—641, 1986.
- 13) Wakamatsu K, Ito S: Improved HPLC determination of 5-S-cysteinyldopa in serum. Clin Chem 40: 495—496, 1994.
- 14) 加藤泰三, 末武茂樹: メラノーマの治療をめぐる. 皮膚病診療 18: 107—112, 1996.
- 15) Zimmerman LE, McClean IW, Foster WD: Does enucleation of the eye containing a malignant melanoma prevent or accelerate the dissemination of tumor cells? Br J Ophthalmol 62: 420—425, 1978.

- 16) **Ito S, Wakamatsu K**: Melanin chemistry and melanin precursors in melanoma. *J Invest Dermatol* 62: 261—265, 1989.
 - 17) **Ito S**: Melanin-related metabolites as markers of melanoma: A review. *J Dermatol* 19: 802—805, 1992.
 - 18) **Mason HS**: The chemistry of melanin. III. Mechanism of the oxidation of dihydroxyphenylalanine by tyrosinase. *J Biol Chem* 172: 83—99, 1948.
 - 19) **森嶋隆文, 柴田明彦**: 5-S-CD による悪性黒色腫の診断. *臨皮* 43: 593—597, 1981.
 - 20) **堀越貴志, 伊藤祥輔, 若松一雅, 小野寺英夫, 江口弘晃, 川村邦子, 他**: 血清5-S-CD(5-S-cysteinyldopa)の変動と悪性黒色腫の予後. *Skin Cancer* 6: 304—308, 1991.
 - 21) **Horikoshi T, Ito S**: Serum 5-S-cysteinyldopa(5-S-CD) as a marker of melanoma progression. *J Dermatol* 19: 809—813, 1992.
 - 22) **加曾利潤一郎, 森嶋隆文**: 頭蓋内悪性黒色腫の脳髄液の5-S-cysteinyldopa測定と蛍光法的細胞診による診断. *皮膚* 36: 7—15, 1994.
 - 23) **鈴木治之, 鈴木純一, 関根伸子, 西野和明, 中川 喬, 武田宗泰, 他**: 脈絡膜に転移した皮膚悪性黒色腫の1例. *日眼会誌* 99: 98—103, 1995.
-