正常眼圧緑内障における watershed zone と視野障害との関連

佐藤 之英, 富田 剛司, 恩田 鋭治, 後藤 靖彦, 小栗 章弘, 北澤 克明

岐阜大学医学部眼科学教室

要 約

正常眼圧緑内障患者 27 例の両眼に対し, 走査型レーザー検眼鏡を用いてインドシアニングリーン蛍光眼底造影を施行した。脈絡膜分水嶺(以下, watershed zone)と視神経乳頭の位置関係を同定し, Humphrey 自動視野計による視野指標との関連を検討した。Watershed zone が乳頭を含まないタイプは 7 例 8 眼(14.8%), 乳頭の一部を含むタイプは 20 例 32 眼(59.3%), 乳頭の全体を含むタイプは 10 例 14 眼(25.9%)であった。また, 17 例(63.0%)で watershed zone のタイプが両眼で一致し, 10 例(37.0%)は不一致であった。Watershed zone のタイプが両眼で異なる 11 例について, 両眼を視神経乳頭が watershed zone により多く含まれる側とそうでない

側とに分けて比較したところ, より多く含まれる側の眼で視野 mean deviation(以下, MD)は低い値であった($p < 0.05$)。また, 左右眼を視野指標の大小によって分け, タイプの違いを比較したところ, MD の低い側の眼で, watershed zone により多く含まれるタイプのものが多かった($p < 0.05$)。Watershed zone と視神経乳頭との位置関係は視野障害の進行に影響を与える可能性が示された。(日眼会誌 102: 502—508, 1998)

キーワード: 正常眼圧緑内障, 視野欠損, 脈絡膜分水嶺, インドシアニングリーン蛍光眼底造影, 走査型レーザー検眼鏡

Association between Watershed Zone and Visual Field Defect in Normal Tension Glaucoma

Yukihide Sato, Goji Tomita, Eiji Onda, Yasuhiko Goto, Akihiro Oguri and Yoshiaki Kitazawa

Department of Ophthalmology, Gifu University School of Medicine

Abstract

In order to evaluate the association between the watershed zone and glaucomatous optic damage, we performed indocyanine green fluorescence angiography with a scanning laser ophthalmoscope in 54 eyes of 27 patients with normal tension glaucoma. The visual field indices were measured with a Humphrey Field Analyzer. We identified 8 eyes (14.8%) of 7 patients with a watershed zone not including the optic nerve head (type I), 32 eyes (59.3%) of 20 patients with the zone partially including the optic nerve head (type II), and 14 eyes (26.0%) of 10 patients with the zone including the optic nerve head (type III). Of the total of 27 patients, 10 patients (37.0%) had different types in each eye. In these patients, the mean deviation (MD) of visual field indices was

worse in the eye with the watershed zone which included a larger part of the optic disc than in the contralateral eye ($p < 0.05$). Conversely, the eye with worse MD than the contralateral eye had a watershed zone which included a larger part of the optic disc than the other eye ($p < 0.05$). The location of watershed zone appeared to influence the progression of the visual field defect. (J Jpn Ophthalmol Soc 102: 502—508, 1998)

Key words: Normal tension glaucoma, Visual field defect, Watershed zone, Indocyanine green fluorescence angiography, Scanning laser ophthalmoscope

I 緒 言

正常眼圧緑内障の病因論に関しては, 眼圧による機械

的障害を主因とする説と, 血管攣縮や血管壁および血液成分の変化などによる視神経乳頭内の末梢循環不全をより重視する説が従来から存在する。Hayreh^{1)~3)}は正常眼

別刷請求先: 500-8705 岐阜県岐阜市司町 40 岐阜大学医学部眼科学教室 佐藤 之英

(平成 9 年 12 月 16 日受付, 平成 10 年 3 月 3 日改訂受理)

Reprint requests to: Yukihide Sato, M.D. Department of Ophthalmology, Gifu University School of Medicine, 40 Tsukasamachi, Gifu-shi, Gifu-ken 500-8705, Japan

(Received December 16, 1997 and accepted in revised form March 3, 1998)

表 1 対象の背景因子

例数	眼数	男/女	年齢(歳)	MD(dB)	CPSD(dB)	IOP(mmHg)	屈折(D)
27	54	9/18	59.7 ± 14.8 (18~80)	-7.27 ± 6.40 (-23.32~1.38)	7.22 ± 4.66 (0.00~15.44)	14.5 ± 2.2 (9.7~18.7)	-2.04 ± 4.36 (-10.50~3.5)

平均値 ± 標準偏差 (レンジ)

MD: mean deviation CPSD: corrected pattern standard deviation IOP: intraocular pressure

表 2 Watershed zone の分類

タイプ 1	視神経乳頭を含まない
タイプ 2	視神経乳頭の一部を含む
タイプ 3	視神経乳頭全体を含む

圧緑内障を含む緑内障眼にフルオレセイン蛍光眼底造影(以下, FAG)を施行し, 80%以上の症例で動脈性の充盈遅延部位である脈絡膜分水嶺(以下, watershed zone)が視神経乳頭を含む乳頭周囲脈絡膜に観察されたと報告し, 緑内障性障害の発生と watershed zone の存在部位との関連を指摘した。彼は緑内障性障害について循環不全説を重視する立場をとり, その根拠として視神経乳頭の篩板前部および篩板部の血管は短後毛様動脈由来の乳頭周囲脈絡膜動脈からの分枝であることをあげている^{1)~6)}。しかしながら, 対照群と比較した場合, 視神経乳頭部が watershed zone に含まれる頻度に有意な差はなかったとの報告⁷⁾もあり, 眼底における watershed zone の部位が緑内障性視神経障害の発症や進行に影響を及ぼすか否かについては意見の一致をみていない。

Watershed zone に関する知見が未だ完全には得られていない理由の1つとして, 従来の眼底カメラによる FAG では, 造影早期のごく一瞬にしか捕えることのできない脈絡膜血流の watershed zone を十分に検出するのが難しかったことがあげられる。一方, 走査型レーザー検眼鏡(以下, SLO)を用いたインドシアニングリーン蛍光眼底造影(以下, ICG 造影)は, 励起光, 蛍光とも網膜色素上皮を透過する近赤外光を用いるため, 脈絡膜の観察に優れている。また, ICG 色素はその 98%以上が血中で血漿蛋白と結合し高分子となるために, fenestration が存在する脈絡膜血管からの漏出が少なく, 脈絡膜の血流動態を観察するのに適した方法とされ, 近年臨床への応用が普及しつつある⁸⁾⁹⁾。これに加えて, 単波長のレーザー光と共焦点孔で眼底を観察する SLO は画像の解像度が高く, また, 1/30 秒毎に記録されたビデオテープ画像を連続的に 1 画像ずつ観察することにより, 従来の写真による判定に比して造影極早期の血流動態の解析がより詳細に行える利点がある。

今回我々は, watershed zone が乳頭部を含む部分に存在することが, 特に正常眼圧緑内障の緑内障性障害に何らかの関連を有するか否かを検討する目的で, FAG に比して脈絡膜循環動態の解析がより詳細に可能であると

考えられる SLO-ICG 造影法を用いて watershed zone と視神経乳頭の解剖学的な位置関係を同定するとともに, それを両眼で比較し, その位置関係の違いと緑内障性視野変化との関連を検討したので報告する。

II 対象および方法

岐阜大学医学部附属病院眼科において経過観察中の正常眼圧緑内障患者のうち, 平成 7 年 5 月から平成 8 年 12 月の間に眼圧変動測定のために入院中あるいは外来経過観察中に ICG 造影を施行した 57 例のうち, 中間透光体混濁が強い例や, 眼球運動が強く良好な ICG 造影像が得られなかった例, 両眼の検査が施行できなかった例および自動視野計測による視野測定結果の信頼性の低い例を除外した 27 例 54 眼(年齢 19~80 歳, 平均値 ± 標準偏差 59.7 ± 14.8 歳, 男/女 = 9/18)を解析の対象とした(表 1)。正常眼圧緑内障の診断基準は, ①眼圧が 21 mmHg を超えない(2 時間毎に 24 時間測定した眼圧日内変動値を含む), ②両眼正常開放隅角, ③両眼に緑内障性視神経乳頭変化と視神経線維層欠損を認め, 少なくとも 1 眼に緑内障性視野変化が存在する, ④視神経乳頭の緑内障様変化を惹起し得る疾患が除外される, の 4 条件をすべて満たすものとした。対象者からは, 検査の内容を十分説明した上で全員インフォームド・コンセントを得た。

ICG 造影は, SLO(ローデンストック社製, ドイツ)の赤外線レーザー(770 nm)を用い, レーザー強度 5(Laser IR, 5), ビデオ感度は自動設定(Video gain, A)としてインドシアニンフィルター(filter, IF)を入れ, 蒸留水 1 ml に溶解したインドシアニングリーン 5 mg を前腕表在静脈内に留置した翼状針(22 ゲージ)から急速静注して施行した。眼底撮影は画角 40 度で 1 分間以上行い, 造影結果はビデオテープ(8 mm ビデオ, Hi 8 HG, ソニー社製)に記録した。次いで, 1 秒間に 30 画面の画像を 1 画面ずつ造影初期から観察しながら, 1 人の検者が画像以外の臨床情報を伏せた上で, watershed zone の確認と視神経乳頭との位置関係の同定を行った。各眼について, watershed zone が視神経乳頭を含まない(タイプ 1)(図 1, 2), 一部を含む(タイプ 2)(図 3, 4)および視神経乳頭全体を含む(タイプ 3)(図 5, 6)の 3 群に分類した(表 2)。この判定は造影剤の眼底への出現後 5 秒以内に行った。1 眼の造影検査後, 少なくとも 3 日以上おいて他眼の検査を行った。

視野検査は, 全対象眼に対して Humphrey Field Ana-

図1 タイプ1の例インドシアニングリーン(ICG)静注後23.3秒.
Watershed zoneは視神経乳頭を含まないと判定した.

図2 図1のシェーマ.
矢印は watershed zone を示す(以下同じ).

図3 タイプ2の例 ICG 静注後17.3秒.
Watershed zoneは視神経乳頭の一部を含むと判定した.

図4 図3のシェーマ.

図5 タイプ3の例 ICG 静注後23.1秒.
Watershed zone は視神経乳頭全体を含むと判定した.

図6 図5のシェーマ.

lyzer 630(ハンフリー社製, 米国), プログラム中心30-2で行い, 視野解析プログラムSTATPAC IIで計算されるmean deviation(以下, MD)およびcorrected pattern standard deviation(以下, CPSD)を緑内障性視野障害の指標として用いた. 固視不良, 偽陽性, 偽陰性率ともすべ

て20%以下であった. このようにして分類した両眼の watershed zone のタイプと MD および CPSD を比較検討し, 同時に眼圧および屈折値についても比較を試みた. 眼圧は Goldmann 圧平眼圧計を用いて測定し, 2回目の造影検査日より前で, かつその日に一番近い診察時の結果と, その後の2回の診察時の値の計3回を平均して眼

表 3

	例数	眼数(%)	男/女	年齢(歳)*	MD(dB)*	CPSD(dB)*	IOP(mmHg)*	屈折(D)*
タイプ 1	7	8(14.8)	0/7	62.8±10.0	-5.56±4.49	8.16±5.35	15.1±2.9	-1.06±4.65
タイプ 2	20	32(59.3)	7/13	56.4±15.9	-7.31±6.10	8.40±4.12	14.5±2.1	-1.77±3.99
タイプ 3	10	14(25.9)	4/6	58.1±18.3	-10.14±7.97	7.97±4.58	13.6±2.1	-3.89±5.00

平均値±標準偏差 * : NS(Kruskal-Wallis の検定)

表 4 Watershed zone タイプ

両眼で一致 17人(63.0%)	男/女=7/10	年齢63.2±13.1(歳)
タイプ 1	1人(3.7%)	
タイプ 2	12人(44.4%)	
タイプ 3	4人(14.8%)	
両眼で不一致 10人(37.0%)	男/女=2/8	年齢53.6±16.0(歳)
タイプ 1 とタイプ 2	4人(14.8%)	
タイプ 1 とタイプ 3	2人(7.4%)	
タイプ 2 とタイプ 3	4人(14.8%)	

平均値±標準偏差

圧値とした。屈折値はオートケラトrefraktometer KR-7100 P(トプコン社製)で測定し、等価球面值を用いた。

統計学的解析法として、対応のある 2 群間の平均値の比較に Wilcoxon 符号順位検定を、対応のない 3 群間の比較に Kruskal-Wallis の検定を用い、有意水準は p<0.05 とした。

III 結 果

視野 MD 値の範囲と平均値±標準偏差は、-23.32~1.38 dB, -7.27±6.40 dB であり、CPSD のそれは、0.00~15.44 dB, 7.22±4.66 dB であった。眼圧および屈折のそれは、それぞれ 9.7~18.7 mmHg, 14.5±2.2 mmHg および -10.50~3.50D, -2.04±4.36D であった(表1)。ICG 造影において、全眼で眼底後極部に watershed zone が観察された。Watershed zone が視神経乳頭を含まないタイプ 1 は 7 例 8 眼(14.8%)、一部を含むタイプ 2 が 20 例 32 眼(59.3%)、乳頭全体を含むタイプ 3 は 10 例 14 眼(25.9%) であった。また、各タイプ間において、年齢、MD、CPSD、眼圧、屈折に有意な差はなかった(Kruskal-Wallis の検定、表3)。17 例(63.0%)で watershed zone のタイプが両眼で一致し、10 例(37.0%)は不一致であった。タイプが両眼で同じであった 17 例の内訳は、タイプ 1 が 1 例(5.9%)、タイプ 2 が 12 例(70.6%)、タイプ 3 は 4 例(23.5%) であった(表4)。Watershed zone のタイプが両眼で異なっていた 10 例の内訳は、タイプ 1 とタイプ 2 の組み合わせが 4 例(40.0%)、タイプ 1 とタイプ 3 の組み合わせが 2 例(20.0%)であり、タイプ 2 とタイプ 3 の組み合わせは 4 例(40.0%) であった(表4)。

図 7 両眼で watershed zone タイプが異なる場合の mean deviation (MD) 値の比較。

図の水平線は 10、90% の各パーセンタイルを示し、○は 10% 以下と 90% 以上のパーセンタイルのプロットを示す。ボックスは 25~75% のパーセンタイルの分布を示す(以下同じ)。

* : P<0.05 を示す。n=10 pairs

乳頭が watershed zone により多く含まれる側の眼で、MD 値は統計学的に有意に低い値であった。

図 8 両眼で watershed zone タイプが異なる場合の corrected pattern standard deviation (CPSD) 値の比較。

NS : P>0.05 を示す。

n=10 pairs

CPSD 値には統計学的に有意な差はなかった。

両眼で watershed zone のタイプが同じでなかった 10 例について、左右眼を視神経乳頭が watershed zone により多く含まれる側とそうでない側に分け(タイプ 1

図9 両眼のMD値に平均値以上の差がある場合の watershed zone スコアの比較。

*: $P < 0.05$ を示す. $n = 11$ pairs

Watershed zone スコアはタイプ1は1, タイプ2は2, タイプ3は3とした(以下同じ).

MD値の低い側の眼で統計学的に有意に視神経乳頭は watershed zone により多く含まれていた。

図10 両眼のCPSD値に平均値以上の差がある場合の watershed zone スコアの比較。

NS: $p > 0.05$ を示す. $n = 11$ pairs

統計学的に有意な差はなかった。

よりも2,2よりも3の方がより多く含まれるとした), 視野MD値およびCPSD値を比較したところ, 乳頭が watershed zone により多く含まれる側の眼でMD値は統計学的に有意に低い値であった($P = 0.0284$, Wilcoxon 符号順位検定). CPSD値については差はみられなかった($p = 0.1394$) (図7, 8). 眼圧, 屈折値に関しては差はみられなかった。

次に, watershed zone のタイプ1を1, タイプ2を2, タイプ3を3とスコア化し, 左右眼のMD値の差が対象27例の平均値4.29 dB以上であった11例を視野障害の左右差が比較的大きいとして, MD値の大小で左右眼を分けて watershed zone のスコアを比較した. その結果, MD値の低い側の眼で視神経乳頭は watershed zone により多く含まれていることがわかった($p = 0.0431$, Wilcoxon 符号順位検定). また, 眼圧, 屈折値を同様に比較したが, 差はみられなかった. CPSD値について

も同様に, 3.98 dB以上の差のあった11例について検討したが, 有意差はなかった($p = 0.4469$) (図9, 10).

IV 考 按

今回, 我々はICG造影による観察で watershed zone と視神経乳頭との位置関係を同定し, 視野障害との関連性を検討した. その結果, 対象全例で watershed zone が観察され, 約60%では左右眼で, その視神経乳頭との位置関係のタイプは一致したが, 残りの約40%では不一致であった. 不一致の症例では, 視神経乳頭が watershed zone により多く含まれる側の眼において視野障害の程度は強かった. さらに, 左右眼の視野指標の差が, 今回の対象となった27例の平均値以上であった例を視野障害の左右差が比較的大きいと諮意的に判断して検討したところ, 視野指標のMD値が左右眼を比べてより低い側の眼において, watershed zone はより多く視神経乳頭を含んでいた。

緑内障性障害に対する脈絡膜血流の循環不全の関与について, FerdinandらはSLOを用いてFAGによる造影輝度を経時的に解析し, 正常眼圧緑内障の脈絡膜において flow/volume で表される refreshment time が正常眼や原発開放隅角緑内障に比し有意に遅延し, また, 原発開放隅角緑内障は網膜の循環速度が低下していることを報告し, 正常眼圧緑内障では, 特に脈絡膜血流の循環が緑内障性障害発生に関連している可能性を指摘した^{10)~12)}.

また, watershed zone と緑内障との関連をFAGで検討した研究である Hayreh ら^{11)~13)}の報告によれば, 原発開放隅角緑内障および正常眼圧緑内障の80%以上の症例で watershed zone が視神経乳頭を含んでいたとしている. このことについて, 彼は緑内障性障害について循環不全説を重視する立場をとり, watershed zone の視神経乳頭に対する存在部位がその障害の成因の一つになっていると結論している. この根拠については, 人眼のFAGおよび摘出眼に対し neoprene latex 注入によって得られた所見, さらに, 組織学的検索から得られた視神経乳頭および視神経乳頭周囲脈絡膜の栄養血管の解剖学的な関係を基に, 以下のように説明されている^{11)~13)}. すなわち, 後極部脈絡膜の栄養血管である短後毛様動脈は終動脈であり, 脈絡膜において隣接するお互いの還流領域の境界に造影剤の充盈遅延部, すなわち watershed zone が生じる. また, 視神経乳頭の篩板前部および篩板部は, 短後毛様動脈由来の乳頭周囲脈絡膜動脈からの分枝によって栄養されている. このために, 乳頭部が watershed zone に含まれることは視神経乳頭の循環不全が存在することを示しており, このことが緑内障性の変化を引きやすくしている原因であろうと結論している. しかしながら, 非緑内障と正常眼圧緑内障を対象として watershed zone の位置を比較検討したところ, watershed

zone が視神経乳頭を含む割合に有意な差はなかったとする報告⁷⁾もあり、我々が以前行った報告でも同様の結果であった¹³⁾。

一方、視神経乳頭の血管系については、血管鋳型標本の走査電子顕微鏡による観察の知見がいくつか報告されており、Simizu ら¹⁴⁾はサル眼の篩板前部を観察し、その血管叢が傍乳頭緑の脈絡膜毛細血管との吻合を有し、また傍乳頭部の短後毛様動脈の分枝が直接灌流し、さらに短後毛様動脈の反回枝が分布していることを指摘した。また、Fryczkowski¹⁵⁾は摘出人眼を観察して、篩板部では短後毛様動脈が直接もしくは Zinn-Haller 動脈輪を介して分布すること、篩板前部では傍乳頭脈絡膜を灌流する短後毛様動脈の分枝が分布することを報告した。さらに、Onda ら¹⁶⁾は摘出人眼 13 眼を観察し、13 眼全眼において短後毛様動脈から篩板前部および篩板部を栄養する分枝が出されており、11 眼は Zinn-Haller 動脈輪から、2 眼は直接短後毛様動脈から分枝していたが、乳頭周囲脈絡膜から視神経乳頭に直接分布する動脈はなかったと報告している。恩田ら¹⁷⁾は短後毛様動脈は視神経乳頭に対する分枝を出してから脈絡膜上に分布するために、watershed zone は脈絡膜における短後毛様動脈の分布および血流動態を示してはいるが、必ずしも視神経乳頭内における循環動態を反映していない可能性を指摘している。

このように緑内障性障害と脈絡膜循環には何らかの関連があると報告はあるものの、watershed zone と緑内障性障害の関係は未だ明らかにされてはいない。

解剖学的な意味で、短後毛様動脈の灌流領域の境界としての watershed zone の位置は、脈絡膜の循環動態に変わりがなければ変化しないと考えられる。しかしながら、天野ら¹⁸⁾は ICG ビデオカメラを用いた ICG 造影によって、健常な若年者 27 例 27 眼および壮年者 21 例 21 眼を対象として脈絡膜初期充盈像を観察し、若年者で認められた視神経乳頭を中心とした watershed zone が壮年者ではほとんど観察されなかったと報告しており、加齢による脈絡膜の循環動態の変化の可能性を示唆している。一方、今回の我々の研究では、壮年者を含めた対象全例で watershed zone が同定された。本研究では、緑内障のみを対象としていること、SLO を用いていることなど、彼らの結果とは単純には比較できないものの、緑内障性障害と脈絡膜循環の変化に何らかの関連がある傍証とも推察され興味深い。

Watershed zone が視神経乳頭を含む割合に差のある 2 群間で、緑内障性障害に差が存在するか否かを比較するためには、2 群間の罹病期間が一致していることが重要と考えられるが、これを一致させることは不可能である。そこで、今回は両眼での差に注目し検討した。検討したサブグループでの両眼の差は、視野指標あるいは watershed zone のタイプの違いのみであり、眼圧、屈折異常などの他の要因には差がなかったことから、今回の結

果からは watershed zone が視野障害の原因である視神経障害の進行に影響を及ぼしている可能性を示していると考えられた。しかしながら、視神経障害の左右差を watershed zone の位置だけで完全に説明することはできない。また、watershed zone が視神経乳頭部に存在しても緑内障を発症しない例も多く存在することから⁷⁾¹³⁾、何らかの他の要因とが複合的に関連しているものと推察された。今後、これらの症例の視野進行を長期観察することにより、脈絡膜循環と視野障害進行との関連がより明確にされることが期待される。

以上、結論として正常眼圧緑内障の中の一部では、watershed zone の存在部位が視野障害の発生に関連している可能性が示された。

本研究の一部は第 8 回日本緑内障学会で佐藤が口演した。

文 献

- 1) Hayreh SS: Blood supply of the optic nerve head in health and disease. In: Lambrou GN, et al (Eds): Ocular Blood Flow in Glaucoma Kugler & Ghedini, Amsterdam, 3—48, 1989.
- 2) Hayreh SS: The central artery of the retina. Its role in the blood supply of the optic nerve. Br J Ophthalmol 47: 651—663, 1963.
- 3) Hayreh SS: *In vivo* choroidal circulation and its watershed zones. Eye 4: 273—289, 1990.
- 4) Singh S, Dass R: The central artery of the retina. I. Origin and course. Br J Ophthalmol 44: 193—212, 1960.
- 5) Singh S, Dass R: The central artery of the retina. II. A study of its distribution and anastomosis. Br J Ophthalmol 44: 280—299, 1960.
- 6) Hayreh SS: Physiological anatomy of the choroidal vascular bed. Int Ophthalmol 6: 85—93, 1983.
- 7) Giuffre G: Main posterior watershed zone of the choroid. Variations of its position in normal subjects. Doc Ophthalmol 72: 175—180, 1989.
- 8) 三木徳彦: 特集 ICG angiography の臨床応用. 原理と技法の進展. 眼科 36: 137—141, 1994.
- 9) Bischoff PM, Flower RW: Ten years experience with choroidal angiography using indocyanine green dye, a new routine examination or an epilogue? Doc Ophthalmol 60: 235—291, 1985.
- 10) Lambrou GN, van den Berg TJTP, Greve EL: Vascular Plerometry of the Choroid. In: Lambrou GN, et al (Eds): Ocular Blood Flow in Glaucoma. Kugler & Ghedini, Amsterdam, 287—294, 1989.
- 11) Ferdinand H, Duijm A, Rulo AHF, Asatin M, van den Berg TJTP, Greve EL: Study of choroidal blood flow by comparison of SLO fluorescein angiography and microspheres. Exp Eye Res 63: 693—704, 1996.
- 12) Ferdinand H, Duijm A, van den Berg TJTP, Greve EL: A comparison of choroidal hemodynamics in patients with primary open-angle glau-

coma and normal-pressure glaucoma. *Am J Ophthalmol* 123: 644—656, 1997.

13) **Onda E, Sato Y, Oguri A, Sugiyama K, Tomita G, Kitazawa Y, et al:** Angiographic evaluation of watershed zone in the peripapillary choroid in glaucoma and non-glaucoma eyes. *Invest Ophthalmol Vis Sci (Suppl)* 37 (3) : 267, 1996.

14) **Shimizu K, Ujiie K:** Structure of Ocular Vessels. Igaku shoin, Tokyo-New York, 108—124, 1978.

15) **Fryczkowski AW:** Blood vessels of the eye and their changes in diabetes. In: Motta PM, et al

(Eds): *Scanning Electron Microscopy of Vascular Casts: Methods and Applications*. Kluwer Academic Publishers, Boston, 293—312, 1992.

16) **Onda E, Cioffi GA, Bacon DR, van Buskirk EM:** Microvasculature of the human optic nerve. *Am J Ophthalmol* 120: 92—102, 1995.

17) **恩田鋭治, 山本哲也:** 緑内障性視神経障害. 循環障害説の立場から. *臨眼* 50: 17—20, 1996.

18) **天野 尚, 米谷 新:** ICG 蛍光眼底造影による脈絡膜循環動態の加齢性変化の検索. *臨眼* 49: 47—54, 1995.