ネコ摘出灌流眼球における carteolol の網膜電図に及ぼす影響

宮村 直孝, 宇治 幸隆

三重大学医学部眼科学教室

要 約

暗順応下のネコ摘出灌流眼球における carteolol の ERG b 波に及ぼす影響を検討した。Carteolol は杆体系の機能を反映する弱刺激でも、杆体系と錐体系の機能を反映する強刺激でも ERG b 波振幅を可逆的に増大させた。その原因としては、1. 網膜血管灌流量の増大、2. ERG b 波発生にかかわる網膜内の受容体への直接作用が考えられ、carteolol のもつ内因性交感神経刺激作用および血管内皮由来平滑筋弛緩因子分泌促進作用の関与が示唆された。(日眼会誌 96: 878-883, 1992)

キーワード: カルテオロール, 網膜電図, ネコ摘出灌流眼球, 内因性交感神経刺激作用, 血管内皮由来平滑筋弛緩因子

Effects of Carteolol on Electroretinograms in Isolated Perfused Cat Eye

Naotaka Miyamura and Yukitaka Uji

Department of Ophthalmology, Mie University School of Medicine

Abstract

Effects of carteolol on ERG b-wave amplitude were investigated in dark adapted isolated perfused cat eyes. Carteolol enhanced ERG b-waves with both strong stimuli that reflect the function of both the rod and cone systems, and weak stimuli that reflect the function of the rod system. These observations suggest the following two ideas i.e.: 1. Carteolol increases the flow in retinal vessels of perfusate. or 2. Carteolol has interaction with retinal β -adrenergic receptors related to the origin of the ERG b-wave. It is likely that both participate in the intrinsic sympathomimetic activity and the release activity of the endothelium derived relaxing factor of carteolol. (Acta Soc Ophthalmol Jpn 96: 878-883, 1992)

Key words: Carteolol, Electroretinogram, Isolated perfused cat eye, Intrinsic sympathomimetic activity, Endothelium derived relaxing factor

I 緒 言

ネコ摘出灌流眼球は、網膜の機能を研究する上で、全身の影響を排除できるため、安定した条件を提供す

る。ネコ摘出灌流眼球を用いて研究した、アドレナリン作動薬および遮断薬の網膜機能に及ぼす影響については、多くの報告^{1)~7)}があり、網膜にはアドレナリン作動性メカニズムが存在することが、示唆されている。

別刷請求先: 514 津市江戸橋2-174 三重大学医学部眼科学教室 宮村 直孝
(平成3年12月27日受付, 平成4年2月12日改訂受理)

Reprint requests to: Naotaka Miyamura, M.D. Department of Ophthalmology, Mie University School of Medicine, 2-174 Edobashi, Tsu 514, Japan

(Received December 27, 1991 and accepted in revised form February 12, 1992)

Gerberら⁹⁾⁷⁾は、 β 遮断薬である propranolol, timolol, および β_2 遮断薬である ICI-118.551 を用いて、網膜電図(以下 ERG)に及ぼす影響を調べ、脂溶性の大きい propranolol と ICI-118.551 は杆体系 b 波振幅を増大させ、錐体系 b 波振幅を減少させるが、脂溶性の小さい timolol はどちらにも影響を与えないことから、この違いは timolol は網膜血管柵を通過しないからだろうと推論している。今回、筆者らは timolol より脂溶性が若干小さいが、内因性交感神経刺激作用⁸⁾や、血管内皮由来平滑筋弛緩因子分泌促進作用⁹⁾をもち β 遮断薬でありながら網膜血流量を増加させるという報告¹⁰⁾¹¹⁾があって緑内障研究領域で注目されている carteolol を用い、ERG に及ぼす影響を調べた結果、若干の知見を得たので報告する。

II 実験方法

方法は Niemeyer らのもの^{12)~15)}に準じて、当教室の灌流システムを作成した。

1. 実験動物および眼球摘出

体重 3.1~4.3 kg の成熟ネコ 4 匹 5 眼を使用した。ネコを塩酸ケタミン(ケタラル®) 40 mg/kg 筋注およびペントバルビタールナトリウム(ネプタール®) 30 mg/kg 筋注にて全身麻酔した。瞳孔は 1%アトロピン点眼にて散瞳させた。肘静脈よりリンゲル液を点滴し、ヘパリン静注用および出血時の補液用のルートとした。眼球摘出は低照明の赤色光のもとで以下のように行った。まず外角切開し、眼窩外壁骨を一部除去後、結膜全周切開を行い、外眼筋を切断し、視神経をできるだけ長く眼球に付けて(12~15 mm)切断した。摘出直前にはヘパリン(1,500 IU/kg)を静注し、血管内凝固をおこりにくくした。1眼摘出後は、ヘパリン拮抗薬硫酸プロタミン 10 mg/kg を静注し、塩酸ケタミンを 1 時間毎に 10 mg/kg 筋注した。1眼の実験終了後、もう 1 眼を同様の方法で摘出した。

摘出した眼球は、手術顕微鏡下に、約 15 分以内で、先細りのポリエチレンカニューレに ophthalmociliary artery を接続し、灌流を開始した。その直後に、検眼鏡にて網膜動脈内を灌流液とともに血液が流れ去るのを確認した。顕微鏡下で見て側副血行路などからの leakage があれば焼灼閉鎖した。また、眼内の抵抗が高くなりすぎないように、1つの渦静脈を開放した。

2. 灌流液および灌流システム

組織培養液 medium 199 (10×, with Earle's salts) 135 ml, HEPES buffer (20 mM) 27 ml, L-glutamine

(20 mM) 4.6 ml, gentamicin (40 mg) 1 ml, new born calf serum 540 ml, 蒸留水 1,188 ml から成る灌流液を、孔径 0.45 μ m の membrane filter (HAWP 04700, ミリポア)で濾過し、100%酸素を通じ飽和させ、室温で pH 7.5 となるように 1 N NaOH または 1 N HCl にて調整した。灌流液は、静水圧にて送り込まれ、灌流量は flow meter で計測しながら調節し (1~2 ml/min), さらに、恒温槽の中のチューブを通して 37°C になるように設定した(図 1)。

3. 刺激装置および記録方法

刺激光は 500 W xenon 光源 (UXL 500 D-0) から 620 nm の干渉フィルターを通して単色光刺激とし、ファイバーオプティクスによって角膜上に導いた。角膜面上でのエネルギーは 0.71 W/m² で、これを 0.0 log unit とした。電極は、銀塩化銀電極を使用し、関電極を角膜上に、不関電極を後極部強膜上に、接地電極はチャンパー内に置いた。網膜電位は、交流増幅器 (AB 610 G, 日本光電) を介してレクチャコーダ (RJG-4124, 日本光電) およびオシログラフ (2230, ソニーテクトロニクス) にて記録した。

4. 順応および刺激光の強度、刺激時間、間隔

1 時間以上、暗順応下で灌流し、ピーク波長が 620 nm の単色光刺激を刺激時間 20 msec で、-2 log unit の刺激光として 30 秒毎に与えながら、ERG が安定するのを待った。

図 1 灌流システム。

灌流液は静水圧 (160 cmH₂O) で送り込まれ、flow meter で流量が測定される。眼球直前の 2 つの小瓶は途中で生じた気泡が眼球内に入らないようにするためのものである。また薬物はこの小瓶の位置で投与される。大きな水槽は恒温槽で 37°C に設定されている。

弱刺激としてピーク波長 620 nm 単色光, 刺激時間 400 msec を用い, 400 nm 刺激において得られた波形と同様の波形が得られるように ND フィルターを調整して rod match とした. 強刺激として強さ 0 log unit で, 刺激光自体による杆体色素の褪色を少なくするため刺激時間 20 msec を用い, 刺激間隔は両者とも 30 秒に設定した.

5. Carteolol の投与方法

薬物は, 灌流液の 1 分間あたりの流量から計算して, 最終的に目的の濃度となって眼球内に送り込まれるように, syringe pump にて眼球に入る前の小瓶の位置で (図 1) 投与した. Carteolol 5~923 μM を 10~16 分間投与し, ERG に対する影響を観察後, 60 分間以上待って, 薬物が完全に wash out され, b 波振幅がもとの大きさに戻ってから, 次の series を開始した.

III 結 果

1. 弱刺激に対する b 波の反応

図 2 に carteolol 57 μM を 10 分間投与しながら, 弱刺激を与えた時の ERG 波形を示す. b 波振幅は投与開始後 12 分で control の 116% に増大し, 40 分で元の大きさに戻った. 図 3 は, 弱刺激の, carteolol 投与による b 波振幅の時間経過である. 最高で約 120% への増大がみられた. いずれの濃度においても b 波頂点潜時に変化はみられなかった.

2. 強刺激に対する b 波の反応

図 4 に carteolol 170 μM を 16 分間投与しながら,

図 2 Carteolol 57 μM を 10 分間投与しながら, 弱刺激を与えた時の ERG 波形の変化. 投与中 b 波振幅は徐々に増大し, 12 分で control の 116% に達した. その後徐々に減少し 40 分で元の大きさに戻った. 刺激光強度 -2 log unit, 刺激時間 400 msec, 620 nm 単色光刺激.

図 3 弱刺激による b 波振幅の時間経過. 投与前の b 波振幅を 100% として b 波振幅を % で表した. Carteolol 投与により b 波振幅は増大し, 再び元の大きさに戻る傾向にあった. b 波振幅が減少しているものは 595 μM と高濃度を投与したものである.

図 4 Carteolol 170 μM を 16 分間投与しながら, 強刺激を与えた時の ERG 波形の変化. b 波振幅は投与開始後 20 分で 160% に増大し 60 分で元の大きさに戻った. 刺激光強度 0 log unit, 刺激時間 20 msec, 620 nm 単色光刺激.

強刺激を与えた時の ERG 波形を示す. b 波振幅は投与開始後 20 分で control の 160% に増大し, 60 分で元の大きさに戻った. b 波の頂点潜時には影響はみられなかった. 図 5 は, 強刺激の, carteolol 投与による b 波振幅の時間経過である. 強刺激のほうが弱刺激に比して増加率は大きく, 最高で約 175% への増大がみられた.

図 5 強刺激による b 波振幅の時間経過.

図 3 と同様に投与前の b 波振幅を 100% とした. Carteolol 投与により最高で 175% への増加が見られた.

図 6 Carteolol の濃度と b 波振幅比との関係.

Carteolol 投与前の b 波振幅を 100% とし最も変化した値の比を縦軸に示す. 上が弱刺激, 下が強刺激のものである. 図内の直線は 250 μM 以下における回帰直線 (弱刺激: $y=0.06x+108.9$, 強刺激: $y=0.288x+102.2$). 250 μM 以下での相関係数は, 弱刺激: 0.849 ($p<0.05$), 強刺激: 0.650.

3. 濃度と増加率の関係

Carteolol の濃度と b 波振幅増加率の関係を図 6 に示した. 上が弱刺激の, 下が強刺激のものである. 図

図 7 Carteolol の濃度と灌流液の流量の変化.

Carteolol 投与前の流量に対し, 最も変化した値の比を縦軸に示す. Carteolol 濃度と流量の変化との間には有意な相関関係はなかった.

内の直線は 250 μM 以下における回帰直線を示す. 250 μM 以下での相関係数 r は, 弱刺激では 0.849 で t 検定によれば有意な正の相関を示した ($n=7, p<0.05$) が, 強刺激では $r=0.650$ で有意な相関はなかったが濃度依存の傾向はみられた.

4. Carteolol の灌流液の流量に対する影響

灌流液は静水圧でカニューレから動脈内に送り込まれるため, 眼球側の抵抗の変化によって増減する流量を流量計で記録することができる. 図 7 は carteolol の濃度と灌流液の流量の変化を表したものであるが, 濃度と流量の変化の間には有意な相関関係はなく, むしろ, 灌流量が減少しているもののほうが多かった.

IV 考 按

Niemeyer ら^{1)~5)}は, ネコ摘出灌流眼球で, β 刺激薬である nyldrin の ERG に及ぼす影響を検討し, 暗順応・明順応ともに ERG b 波振幅を増大させることを報告し, 網膜内層に β 受容体が存在することを示唆した. 一方, Gerber ら⁶⁾⁷⁾は, 脂溶性の大きい β 遮断薬である propranolol や ICI 118.551 は b 波振幅を可逆性に, 暗順応では増大させ, 明順応では減弱させたが, このことも, β アドレナリン作動性メカニズムの存在を示すものであると述べている. しかし, その機序については, 明確な説明はなされていない. さらに timolol は, 暗順応下でも明順応下でも, b 波振幅に影響を与えなかったことから, これは timolol が, その小さい脂溶性故に網膜血管柵を通過しないからではないかと推論している. 今回, 我々が使用した carteolol の脂溶性は timolol より若干小さい (20°C で n-octanol と pH 7 の緩衝液との間の分配係数は carteolol は

0.214¹⁶⁾, timololは0.28¹⁷⁾,)。したがって, carteololはさらに網膜血管柵を通過しにくいことが予想されるが, 本実験では, ネコ摘出灌流眼球において, carteololがERG b波に強い影響を与えることを示した。しかし, carteololは最近緑内障研究領域でも注目されているように内因性交感神経刺激作用 (intrinsic sympathomimetic activity: ISA)⁸⁾および血管内皮由来平滑筋弛緩因子 (endothelium derived relaxing factor: EDRF)分泌促進作用⁹⁾があり, 本実験の結果にこれらの因子が関与したことも充分考えられるので, 以下の如く考察を加えた。

本実験では carteololは杆体系の機能を反映する弱刺激でも, 杆体系と錐体系の両者の機能を反映する強刺激でも, ERG b波振幅は増大した。したがって, carteololのb波振幅に及ぼす影響は, propranolol等の β 遮断薬の作用よりも, β 刺激薬の作用に似ている。この実験ではERG b波が増大する因子としては次の2つが考えられる。

1. 網膜血管灌流量の増大
2. ERG b波発生にかかわる網膜内の受容体への直接作用

CarteololはISAによる β 刺激作用とEDRF分泌促進作用をもつので, 内服で網膜血管が拡張したという報告¹⁰⁾や, 点眼でも眼脈流量を増大させたという報告¹¹⁾がある。本実験では carteolol投与により, 灌流量の増大はみられず, むしろ減少しているものの方が多く, 上記の報告とは相反する結果であった。しかし, Almら¹⁸⁾のmicrosphereによる測定ではネコの脈絡膜血流量は734 mg/min, 毛様体は262 mg/min, 虹彩は60 mg/minであり, それに対し網膜は15 mg/minと非常に少ないと述べており, 実際には網膜の灌流量が増加していたとしても全体の2%にすぎないので, 我々が測定した網膜や脈絡膜, 毛様体など全ての脈管の流量を示す値には反映されていなかった可能性がある。

網膜血管の交感神経支配については, Ferrari-Dileo¹⁹⁾はウシ網膜血管には α 受容体も β 受容体も存在すると報告し, Hosteら²⁰⁾は, 網膜血管には機能的な β 受容体はないと述べていて結論は出ていない。一方, 脈絡膜血流は交感神経刺激によって減少し (家兎: 水素クリアランス法²¹⁾, ネコ: microsphere法²²⁾²³⁾), 脈絡膜血管は α 受容体優位であるといわれており²²⁾, 網膜血流と脈絡膜血流は β 遮断薬に対して異なる反応を示すことも考えられる。

したがって, ERG b波の増大は, 全体の灌流量の増加を示さなかったものの網膜血管が拡張し網膜灌流量の増加したための変化である可能性はある。なぜなら, β 遮断薬の持つISAの効果は安静時や睡眠中の交感神経亢進がほとんどない場合に最もよくみられる²⁴⁾というから, 除神経してある摘出眼球では β 遮断作用よりも, ISAが強くあらわれ, 血管は拡張するかもしれないからである。もしHosteら²⁰⁾がいうように網膜血管に機能的な β 受容体がないとしても carteololにはEDRF分泌促進作用があるので, これによって網膜血流を増し, b波振幅を増大させている可能性はあり得る。

一方, Niemeyerら¹¹⁾⁵⁾は, ネコ摘出灌流眼球で β 刺激薬がERG b波振幅を増大させた原因として, digital image analysisによれば, β 刺激薬の末梢血管拡張作用が, 網膜血管には認められず, 有意の灌流量的変化をきたさなかったため, このERGの変化は血流増加ではなく, β 刺激薬が情報伝達にかかわる網膜内 β 受容体を介して生じさせたものであることを示唆すると述べている。したがって, 本実験におけるb波増大の原因はこの β 受容体に何らかの影響が及んだ結果とも考えられる。ヒトで carteolol 20 mg内服後の最高血中濃度は0.09~0.25 μ Mである²⁵⁾, β 遮断作用を期待して投与する常用量はさらに少なく1回5~15 mg, 1日2~3回に分割して内服投与する。今回b波振幅に影響を与えたのは, 約50 μ M以上であり, 用量としてはかなり大きい。それ以下の用量ではERGに影響を及ぼさなかった。これは, carteololの脂溶性が小さいため, 低濃度では網膜血管柵を通過できず, ERGに影響を及ぼさないが, 高濃度では網膜血管柵を通過し, ERG b波発生にかかわる網膜内層の β 受容体に対して, carteololの持つISAが発現したためとも推察できる。

Carteololの網膜血管に及ぼす影響についてはまだ充分解明されていない今日, 本実験の結果からは上に述べた2つの因子がいずれかが作用したと考えられる。Propranololに関して細動脈のレベルで網膜血管を拡張させ, これはカルシウム拮抗作用があるからではないかという報告²⁰⁾があるが, 今後 carteololについても同様の研究が発展することが期待される。

文 献

- 1) Niemeyer G, Cottier D, Resch H: Effects of buphenine (nylidrin) on the perfused mammalian eye. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol

- 225: 33—38, 1987.
- 2) **Niemeyer G, Cottier D, Gerber U**: Effects of β -agonists on b- and c-waves implicit for adrenergic mechanisms in cat retina. *Doc Ophthalmol* 66: 373—381, 1987.
 - 3) **Gerber U, Niemeyer G**: Die Wirkung von Clenbuterol, einem β_2 -adrenergen Agonisten, im perfundierten Katzenauge. *Klin Mbl Augenheilk* 190: 238—240, 1987.
 - 4) **Cottier D, Niemeyer G, Resch H**: Einfluss von Buphenin auf die Retina des isolierten Säugetierauges. *Klin Mbl Augenheilk* 188: 532—536, 1986.
 - 5) **Uji Y, Niemeyer G, Gerber U**: The effects of β -adrenergic agonists on cone systems in the cat eye. *Doc Ophthalmol* 70: 77—87, 1988.
 - 6) **Gerber U, Niemeyer G**: β -adrenergic antagonists modify retinal function in the perfused cat eye. *Clin Vis Sci* 3: 255—266, 1988.
 - 7) **Niemeyer G, Gerber U, Uji Y**: Wirkung von β -Blockern auf die Netzhautfunktion in vitro. *Klin Mbl Augenhk* 192: 391—394, 1988.
 - 8) **Yabuuchi Y, Kinoshita D**: Cardiovascular studies of 5-(3-tert-butylamino-2-hydroxy) propoxy-3,4-dihydrocarbostyryl hydrochloride (OPC-1085), a new potent β -adrenergic blocking agent. *Jpn J Pharmacol* 24: 853—861, 1974.
 - 9) **Janczewski P, Boulanger C, Iqbal A, et al**: Endothelium-dependent effects of carteolol. *J Pharmacol Exp Ther* 247: 590—595, 1988.
 - 10) 函師郁子, 土坂寿行, 金 恵媛, 他: カルテオロールの網膜血管におよぼす影響. *日眼会誌* 95(抄録): 315, 1991.
 - 11) 山崎 斉, 馬場裕行, 所 敬: チモロール及びカルテオロール点眼による眼脈流量の変化について. *日眼会誌* 95(抄録): 266, 1991.
 - 12) **Niemeyer G**: The function of the retina in the perfused eye. *Doc Ophthalmol* 39: 53—116, 1975.
 - 13) **Niemeyer G**: Neurobiology of perfused mammalian eyes. *J Neurosci Methods* 3: 317—337, 1981.
 - 14) **Dawis SM, Hofmann H, Niemeyer G**: The electroretinogram, standing potential, and light peak of the in vivo cat eye during acid-base changes. *Vision Res* 25: 1163—1177, 1985.
 - 15) 宇治幸隆, **Niemeyer G**: Perfused eye を用いた電気生理学的研究について. 安達恵美子編: 眼科Mook 41 視覚電気生理, 最近の知識. 東京, 金原出版, 30—49, 1989.
 - 16) 木戸 勝, 森 英雄, 森田 國光, 他: 5-(3-tert-butylamino-2-hydroxy) propoxy-3,4-dihydrocarbostyryl hydrochloride (OPC-1085) の構造ならびに安定性について. *基礎と臨床* 8: 700—711, 1974.
 - 17) **Woods PB, Robinson ML**: An investigation of the comparative liposolubilities of β -adrenoceptor blocking agents. *J Pharm Pharmacol* 33: 172—173, 1981.
 - 18) **Alm A, Bill A**: The oxygen supply to the retina. II. Effects of high intraocular pressure and of increased arterial carbon dioxide tension on uveal and retinal blood flow in cats. *Acta Physiol Scand* 84: 306—319, 1972.
 - 19) **Ferrari-Dileo G**: Beta₁ and beta₂ adrenergic binding sites in bovine retina and retinal blood vessels. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 29: 695—699, 1988.
 - 20) **Hoste AM, Boels PJ, Andries LJ, et al**: Effects of beta-antagonists on contraction of bovine retinal microarteries in vitro. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 31: 1231—1237, 1990.
 - 21) 政岡史子: 交感神経の脈絡膜循環に及ぼす影響. 第1報. 上頸交感神経節切断および刺激効果の水素クリアランス法による検討. *眼紀* 37: 140—146, 1986.
 - 22) **Bill A**: Autonomic nervous control of uveal blood flow. *Acta Physiol Scand* 56: 70—81, 1962.
 - 23) **Weiter JJ, Schachar RA, Ernest JT**: Control of intraocular blood flow. II. Effects of sympathetic tone. *Invest Ophthalmol* 12: 332—334, 1973.
 - 24) **Taylor SH**: Intrinsic sympathomimetic activity: Clinical fact or fiction? *Am J Cardiol* 52: 16D—26D, 1983.
 - 25) **Ishizaki T, Ohnishi A, Sasaki T, et al**: Pharmacokinetics and absolute bioavailability of carteolol, a new β -adrenergic receptor blocking agent. *Eur J Clin Pharmacol* 25: 95—101, 1983.