

殺菌消毒用点眼薬 サンヨード（要指導医薬品）について

公益財団法人 日本眼科学会

公益社団法人 日本眼科医会

日本眼感染症学会

9月1日（木）に参天製薬株式会社より殺菌消毒用点眼薬 サンヨード（要指導医薬品）が発売されます。

本剤は、医療用医薬品であるPA・ヨード点眼・洗眼液（ロートニッテン株式会社）のスイッチOTCです。本剤開発の経緯ですが、日本眼感染症学会から複数の製薬企業に利便性の高い形での点眼製剤化を要望したものの、医療用医薬品としての製品化が難しく、最終的に参天製薬株式会社がOTC医薬品としての開発を受け入れ今回の発売に至ったものです。

スイッチOTCということもあり、患者さんが自己判断で不適切に使用することが懸念されますが、サンヨードが設置されるのは基本的に、眼科医師による推奨意向に対応した調剤薬局であり、販売も眼科医師の推奨に基づくものとなります。

また、本剤は要指導医薬品のため、薬剤師による対面販売が義務付けられており、販売に際しては本剤の使用の可否や眼科受診の必要性を薬剤師がチェックシートで確認する必要があります。

以上のように、先生方と薬局が十分に連携した上で、本剤を適切に使用して頂くよう、よろしくお願いいたします。

項目	内容							
医薬品分類	要指導医薬品							
効能・効果	目の殺菌・消毒							
用法・用量	添付の希釈液（全量）で5倍に希釈し、1回1～3滴、1日4～5回点眼してください。 ●用法・用量に関する注意 (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 (2)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。 (3)容器の先を、目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください（目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります）。また、混濁したものは使用しないでください。 (4)点眼用にのみ使用し、目以外には使用しないでください。 (5)添付文書裏面のサンヨードの希釈方法の手順に従い、添付の希釈液で希釈してご使用ください。（必ず添付の希釈液を用いるようにしてください。）							
成分・分量	<table border="1"><thead><tr><th>成分</th><th>分量(1mL中)</th></tr></thead><tbody><tr><td>ヨウ素</td><td>2mg</td></tr><tr><td>ポリビニルアルコール（部分けん化物）</td><td>80mg</td></tr></tbody></table> <p>添加物としてヨウ化カリウムを含有します。 また、薬剤液を希釈するための希釈液として、生理食塩水が添付されています。</p>	成分	分量(1mL中)	ヨウ素	2mg	ポリビニルアルコール（部分けん化物）	80mg	
成分	分量(1mL中)							
ヨウ素	2mg							
ポリビニルアルコール（部分けん化物）	80mg							
貯法	(1)希釈前は、冷蔵庫で、上向きに保管してください。 (2)薬剤液を希釈した後の点眼液は、添付の携帯袋に入れ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管し、3日以内に使用してください。							

●ヨウ素薬剤液1mLと希釈液4mLを個別容器に充填した2剤で構成されており、使用時に2つの容器口部を接合して振り混ぜて希釈します。